

# TERRALIFE® - MAISPRO TR 50

Ausgewogene, zum Teil winterharte Zwischenfrucht für Maisfruchtfolgen



## Profil

MaisPro TR 50 ist die ideale Mischung für Maisfruchtfolgen. Sie unterstützt gezielt die Mykorrhizierung von Mais und verbessert dadurch die Bodenstruktur. Bei gutem Gelingen der Zwischenfrucht ist im Frühjahr eine Bodenbearbeitung auf Tiefe des Maisablagehorizontes ausreichend. So bleibt die Kapillarität erhalten, wodurch die Keimwasserverfügbarkeit gesichert wird.

Mit jährlich mehr als 30.000 ha Anbaufläche ist TerraLife®-MaisPro für viele Landwirte die erste Wahl als Zwischenfrucht!

MaisPro TR ist in den Varianten 30 und 50 mit reduziertem Anteil an Leguminosen (<30 % bzw. <50 %) erhältlich und kann somit je nach Bundeslandregelung ohne Einschränkung durch den Leguminosenanteil gedüngt werden. Hierzu die aktuellen Gesetzestexte beachten.

- ✓ Hinterlässt eine optimale Bodenstruktur
- ✓ Fördert den Wurzeltiefgang
- ✓ Sehr gute N-Verwertung
- ✓ Teilweise winterhart

N-Potenzial ca. **80 kg/ha**

## Zusammensetzung

40.2%	Leguminosen
12%	Kreuzblütler
	Felderbse, Sorghum, Sommerwicke, Öllein, Sonnenblume, Ramtilkraut, Winterwicke, Alexandrinerklee, Abessinischer Kohl, Tiefenrettich, Serradella, Phacelia, Inkarnatklee, Perserklee, Schwedenklee, Rotklee, Weißklee

## Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streueinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Drohne

## Fruchtfolgen

Getreide, Mais

## Anbauhinweise

Aussaatstärke	30 - 35 kg/ha	
Aussaatzeit	von Mitte Juli bis Ende August	Aussaat vor Raps: bis 15. Juli Aussaat als Blümmischung: Ende April bis Ende Mai
Nutzung	Zwischenfrucht, Sommerzwischenfrucht, Winterzwischenfrucht, Gründüngung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 80 kg/ha, leguminosenbetont	



## Abessinischer Kohl

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
P-Aufschluss



## Alexandrinerklee

Trockenkeimer  
Tief- und Polwurzler  
N-Sammler



## Felderbse

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
N-Sammler  
Dichte Durchwurzelung der Krume



## Inkarnatklee

N-Sammler



## Öllein

Trockenkeimer  
Tiefwurzler  
Si-Aufschluss  
Mykorrhizierer



## Perserklee

N-Sammler

## Phacelia

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
P-Aufschluss (org. geb.)  
Mykorrhizierer

## Rotklee

Wurzel- und Ernterückstände 20-30 dt TM/ha  
Humusanreicherung  
Bodengare  
Gute Vorfrucht

## Tiefenrettich

Tiefwurzler  
Unterbodenentfeuchter

## Schwedenklee

N-Sammler

## Ramtillkraut

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
Schattengarebildner  
Mykorrhizierer

## Serradella

Trockenkeimer  
Schattengarebildner  
N-Sammler

## Sommerwicke

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
N-Sammler  
Fördert Antibiose

## Sonnenblume

Tiefwurzler  
Mykorrhizierer

## Sorghum

Sprosswurzler  
Mykorrhizierer  
Pollenreich

## Weißklee

N-Sammler

## Winterwicke

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
N-Sammler  
Fördert Antibiose

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2024, Änderungen vorbehalten.