

# CLASSIC



## Plan d'alimentation

### PRÉPARATION DE LA BUVÉE AU SEAU OU AU MÉLANGEUR

- Verser progressivement l'aliment d'allaitement (AA) dans l'eau à 50 °C et brasser énergiquement 1 à 2 mn.
- Distribuer la buvée lorsque sa température est de 42 ° C.
- Au DAL : suivre les préconisations du fabricant.

### NE PAS OUBLIER

- Dès le 4<sup>ème</sup> jour, distribuer à volonté eau, aliment concentré 1er âge et paille renouvelés fréquemment
- Apport de Vitalcure : 10 g/repas d'AA pendant les 10 premiers jours
- Apport de Vitalfort : 50 g dans 2 l d'eau distribués entre les 2 repas d'AA, les 7 premiers jours

Pour toutes questions complémentaires, consulter votre distributeur

SEMAINE	BUVÉE (L)	NBR DE REPAS	G/L DE BUVÉE*
0-3 jours	Colostrum		
4-7 jours	2	2	150
Semaine 2	2.25	2	150
Semaine 3	2.5	2	150
Semaine 4	3	2	150
Semaine 5	3	2	150
Semaine 6	3	2	150
Semaine 7	2.5	2	150
Semaine 8	2	1	150
Semaine 9	2	1	150

### RECOMMANDATIONS

- Prolonger d'une semaine le plan d'alimentation (à l'identique de la semaine 9) si un veau ne consomme pas 2 kg d'aliment concentré 1er âge/j.
- Volume de buvée : pour les veaux de races spécifiques, consulter votre distributeur.
- Concentration de la buvée :
  - 150 g/l de buvée est équivalent à 175 g/l d'eau
  - Par temps froid, la concentration doit être augmentée de 10%.
- En cas de pression sanitaire élevée, une concentration plus élevée à 175g/l de buvée est possible.